



Muy cerca de alcanzar el mayor hito histórico, el trigo bate todas las marcas

Con el 80% cosechado el trigo promedia 43,3 qq/ha, dejando atrás a la excelente campaña del año pasado. ¿Llegará a superar el record de los 44 quintales del ciclo 2010/11?

Trigo 17/18: la producción muy cerca de los 5 M Tn

En Marcos Juárez siguen saliendo lotes de hasta 76 qq/ha. En Pergamino, una de las áreas más problematizadas por el agua, hay techos de 68 quintales. Las números que marcan las cosechadoras siguen sorprendiendo y dando por el suelo las bajas expectativas que se tenían. Falta aún por cosechar un 20% y las marcas podrían seguir mejorando. Todo parecía indicar una mala campaña para el trigo. Crecía en suelos barrosos, casi en pantanales, en medio de lluvias interminables y con una alta presión de enfermedades. Sin embargo el cultivo ahora muestra un promedio de 43,3 qq/ha. Pero claro, en los lotes de alta productividad se han hecho tres controles y se han aplicado dosis de casi 200 kg de urea, y en el resto no se han hecho menos que dos aplicaciones por enfermedades. La campaña esta casi en dos quintales por encima de los 41,5 qq/ha obtenidos el ciclo pasado. Esta vez se sembró 130 mil hectáreas menos, sin embargo la producción sería de 4,83 M de Tn, quedando muy cerca de los 5 M del año pasado.

Campaña de Trigo 2017/18 GEA - BCR

	Superficie Sembrada	Superficie no cosechada	Rinde	Produccion total
Zona núcleo	1,1 M ha	17,4 mil ha	43,28 qq/ha	4,82 M Tn
Subzonas	Superficie Sembrada (ha)	Sup. no cosechada (ha)	Rinde (qq/ha)	Produccion total (Tn)
Subzona I	303.218	900	41,0	3.690
Subzona II	142.401	2.000	42,0	8.400
Subzona III	207.269	12.500	43,0	53.750
Subzona IV	214.972	1.500	43,0	6.450
Subzona V	265.000	500	47,0	2.350

La soja de segunda cubre el 40% de los lotes

Avanzando sobre aquellos lotes que recibieron algunos milímetros, la siembra de soja de primera progresó solo 2


puntos en esta semana y cubre el 97% de los lotes. De la oleaginosa de segunda, se sembró un 20% más, alcanzando a cubrir el 40% de la superficie intencionada, unas 660 mil hectáreas. Los cuadros implantados crecen en muy buenas condiciones, desplegando sus primeras hojas, sin inconvenientes sanitarios. Pero unos pocos milímetros serían muy bienvenidos para asegurar las emergencias de los lotes que se sembraron con la humedad muy justa.

Maíz, 113 mil ha regulares y malas por falta de agua

Aumenta el número de lotes de maíz en malas condiciones. El 15% pasó a clasificarse como regulares a malas. El estrés hídrico cada semana se hace más intenso y ganas más área. Esto aumenta la preocupación, el periodo más crítico del cereal está a la vuelta de la esquina. Se necesitan lluvias de consideración en los próximos 10 días, ya que los maíces comienzan a florecer y demandar un mayor consumo de agua. Pero también hay zonas que tienen la napa cerca o cultivos más desarrollados. Las siembras más tempranas ya han alcanzado los estratos húmedos y están en excelentes condiciones.

El fantasma de la sequía ronda la región ante otro fin de semana sin lluvias importantes



El domingo 03/12 las tormentas se desplegaron en dos focos de la región, sobre los alrededores de Hernando, este de Córdoba, y Rojas, noreste de Buenos Aires. Allí los registros




superaron los 45 mm. En el resto, los acumulados estuvieron por debajo de los 15 mm. El 60% del área recibió menos de 5 milímetros. Si bien estas descargas mejoraron la condición hídrica de Córdoba, la misma sigue estando con escasas reservas de agua. El resto de la región continúa con reservas regulares e incluso con zonas con sequía. Los pronósticos no son muy alentadores. Se pronostican lluvias para mañana viernes 08/12, y el sábado 09/12, pero puntuales y con acumulados poco significativos.



Semana al 07 de diciembre de 2017 - N° 531 - AÑO X - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



LLUVIAS SEMANALES A NIVEL NACIONAL




GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS



SUBZONAS Y RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS GEA



SUBZONA I

Los 9 milímetros que recibió **El Trébol** el domingo 03/12 no fueron suficientes para seguir con las siembras. La cosecha de trigo sí pudo avanzar, pero la siembra de soja de segunda no pueda seguir el paso de las cosechadoras por la falta de humedad. Falta sembrar el 50%. Y las cosechadoras ya avanzaron sobre el 80% de los lotes de trigo. Los promedios siguen rondando los 35 qq/ha. Los techos alcanzan los 55 quintales. Los ingenieros indican que la calidad es regular, pero un poco mejor que la del año pasado. No se aprecian efectos en los rindes por los ataques de enfermedades. Los lotes de soja de primera están creciendo en muy buenas condiciones. Solo se observa la presencia de megascelis, por lo que se tuvieron que realizarse controles. Los maíces están muy buenos, sin limitantes de crecimiento ni problemas de enfermedades o insectos. No se observan síntomas de falta de agua, el cultivo está bien provisto por las reservas en profundidad.

A partir del 15 de diciembre empieza en la zona la siembra de los maíces tardíos, si el agua acompaña las intenciones.

SUBZONA II


El pasado fin de semana, la tormenta dejó entre 15 y 30 mm tras su paso por Teodelina. Los milimetros resultaron un tanto desperejados, pero el agua fue suficiente para renovar los animos y seguir con las siembras. Se pudo terminar de implantar el 5% de los lotes que estaban pendientes con soja de primera. También se avanzó sobre el 30% de los cuadros de soja de segunda y sobre la mitad de los lotes tardíos de maíz. Se avanzó con algunos lotes que estaban con la humedad muy justa, sería muy importante el regreso de las lluvias para evitar problemas de emergencias, comentan los técnicos. La cosecha de trigo alcanzó a la mitad de los cuadros. Los rindes promedios están superando los 45 qq/ha. Los cuadros de maíz y soja mejoraron su condición tras las últimas lluvias. "El crecimiento volvió a activarse y dejamos de ver maíces con las hojas acartuchadas", comentan los técnicos del área.

SUBZONA III

"Fueron muy sectorizadas, dejaron entre 40 y 10 mm", cuentan los ingenieros de las lluvias del fin de semana pasado en **Pergamino**. Pero permitieron poder retomar las siembras. Se terminó con la siembra de la oleaginosa de primera y en la de segunda se avanzó casi en un 40%. También los maíces tardíos entraron en escena, su siembra ya muestra un progreso del 50% sobre la superficie intencionada. En gran parte se hacen sobre lotes que se pensaban hacer en fechas tempranas, entre septiembre y octubre. Los técnicos señalan que sería muy importante contar con nuevas lluvias para asegurar estas implantaciones que se realizaron.

También se están realizando la siembras de sectores que estaban afectados con grandes excesos. "Todas las lagunas fueron sembradas", resumen los técnicos,

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas



**DIRECCIÓN
DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS**

BCR



Semana al 07 de diciembre de 2017 - N° 531 - AÑO X - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO

contando que hasta hace dos meses no se pensaba en poder sembrarlos.

Falta un 10% para cerrar la cosecha triguera. Los rindes arrancan desde los 36 a 40 quintales, hasta los 60 y 68 qq/ha. "Los que estuvieron por encima de los seis mil kilos son cuadros que se les hizo tres aplicaciones, y se les puso doscientos kilos de urea. A pesar de ser un año tan difícil por la gran presión de enfermedades, la respuesta fue excelente". Los rindes promedios están entre los 45 a 48 qq/ha, "es otro gran año del trigo para la zona", comentan. Las marcas más bajas estuvieron en lotes encharcados, ahí se notaron pérdidas por enfermedades y también una menor calidad de la mercadería obtenida.

En los maíces se nota el estrés hídrico en los cuadros que fueron sembrados más tarde. Lo técnicos recuerdan que buena parte de las siembras de los maíces tempranos se sembraron ya bastante entrados en el mes de octubre. "Esos cuadros están chicos y en 20 días más están floreciendo. Están petisones en 8 a 10 hojas, no pasan el metro. No tienen síntomas muy importantes de stress hídrico, pero sí estaban con menos desarrollo y altura".

En cambio los lotes que se sembraron temprano están muy buenos. Lo mismo sucede con la oleaginosa. "Los cuadros de más reciente siembra están con un retraso que salta a la vista", comentan. No se destacan plagas de importancia, solo se ve algo de bolillera. De las malezas Rama negra está más controlada este año, pero hay preocupación por los escapes y manchones que se ven de yuyo colorado. No se están controlando y esto puede ser un gran problema para la zona en la próxima campaña.

Las tan ansiadas lluvias, que prometían dar un vuelco al escenario seco, el fin de semana pasado solo dejaron 5 mm en **San Antonio de Arco**. La siembra de soja sigue atascadas. De la de primera resta sembrar un 15% del área. La de segunda viene muy retrasada respecto a cómo se está avanzando con la trilla de trigo. "Para la de primera con unos 10 a 15 mm alcanzaría para volver a sembrar pero para las de segunda no, tendrían que llover unos 20 a 25 mm o más", señalan los ingenieros. Los lotes en

general están libres de malezas. Las más complicadas son en este año rama negra y las gramíneas resistentes. Se ha realizado una aplicación más de control en relación a los años anteriores. Sin plagas a la vista, los cuadros están naciendo sin inconvenientes y buena sanidad. La trilla de trigo alcanzó al 40% de los lotes. Los rindes fluctúan desde los 30 a los 40 qq/ha, con buenos pesos hectolítricos, destacan los técnicos, "por encima de 82". A los maíces se los encuentra sanos, sin plagas; desplegando entre la sexta y la octava hoja. "Por el momento no están sufriendo la seca, hay buenas reservas de agua en profundidad". Sin embargo, "se aprecian con menos desarrollo que otros años", continúan. Un 60% se los clasifica entre excelentes y muy buenos. El resto, buenos. Lo que falta por implantar de los maíces tardíos es un 30 %. Los cuadros están a la espera de una nueva lluvia de unos 25 a 30 mm.

SUBZONA IV

En **General Pinto** las lluvias también dejaron sabor a poco, solo 5 mm. Falta aún por terminar un 20% de la soja de primera y toda la de segunda. Con la cosecha triguera se hacen los primeros lotes, está cosechado menos del 5% y hay buenos rindes. "Vimos lotes salir con 60 quintales, pero se tratan de caosos aislados, aún es difícil ponerle número a la región", comentan los técnicos, que siguen estiamando un poco más de 35 quintales, pero nadie aún se aventura a pensar rindes generalizados por encima de los 40 qq/ha. Los efectos de las royas se ha sentido este año, numerosos lotes se quedaron sin hojas. El ataque de roya amarilla y anaranjada fue muy fuerte y de golpe. De todas maneras la cosecha está en tiempo, prácticamente no se ha adelantado y eso es una buena señal. Los maíces tempranos están largando la cuarta a séptima hoja. Hasta ahora no se refieren efectos de consideración por la falta de agua en los horizontes superficiales. Y las emergencias de las sojas que sembraron en la última tanda están emergiendo bien, aunque todos se tranquilizarían más si este finde semana llegara el agua a la zona con unos 10 a 20 mm" expresan los técnicos.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





SUBZONA V

Avanza la cosecha de trigo en **Marcos Juárez**. Un 85% de la superficie fue recolectada y los resultados siguen sorprendiendo. Máximos de 70 qq/ha, con promedios de 45. Sin embargo, la calidad no es tan buena, señalan los ingenieros. Los altos rendimientos conllevan una disminución de la proteína. El avance de la siembra de la oleaginosa de segunda viene algo lenta. Se lleva implantado un 50% del área. La siembra de soja de primera lleva 15 días detenida, aunque solo queda por terminar un 5%. Los maíces sembrados también continúan a la espera de nuevas lluvias. Tiene que ser importante para darle un vuelco a la situación. A diez días de entrar en floración, un 30% de los cuadros bajaron su condición a regular y mala. Por el lado del cereal de diciembre, los cuadros están comenzando a sembrarse en aquellas zonas donde recibieron algunos milímetros.

La cosecha de trigo tuvo grandes progresos en **Corral de Bustos**. Se avanzó sobre el 80% de los lotes y los ingenieros indican que para este fin de semana completarían lo que falta. Los rindes en los suelos más pobres, de Clase IV, promediaron los 45 qq/ha. En los mejores lotes los rindes sobresalieron mucho más de lo que se esperaba con 60 a 70 qq/ha. Los profesionales admiten que a pesar de la fuerte presión de enfermedades, los controles fueron muy efectivos, realizándose hasta dos aplicaciones. "Climáticamente, tuvimos mejores condiciones que el año pasado", señalan. La campaña anterior se perdieron muchos lotes por excesos hídricos. "Este año no hubo pérdidas y el clima fue a favor del cultivo", destacan. Incluso los maíces también se ven muy buenos. La napa cercana mantiene al cultivo en excelentes condiciones. A medida que nos dirigimos hacia el norte la napa se encuentra más profunda y las lluvias fueron prácticamente nulas estas últimas semanas. Al norte de Marcos Juárez no llovió. Allí los maíces comienzan a manifestar la falta de agua. Las lluvias que recibió Corral el miércoles 29/11, de entre 15 a 35 mm, le bastaron para

recargar los perfiles y mantener al cereal como así también avanzar con la siembra de soja de segunda. Se lleva implantado un 50% de la superficie. Sin embargo en aquellos lugares que recibieron menos agua, comienza a escasear la humedad y puede frenarse en algunos días. Los maíces tardíos, que ocupan un 5% del maíz total, deberán aguardar que finalice la siembra de la oleaginosa para poder ser implantados.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





INDICADORES CLIMÁTICOS

El pronóstico para la semana que viene en la región núcleo:

Viernes y sábado con lluvias débiles

El viernes 08/12, la entrada de un frente frío provocará algunas lluvias y tormentas débiles. El viento norte y al alta radiación solar se harán sentir en la semana. Las temperaturas máximas tocarán los 35°C.

Un nuevo frente frío cargará sobre la región centro, avivando nuevas tormentas. Pero se tratará de un pasaje débil y la escasa humedad que hay en las capas bajas de la atmosfera no alcanzará para desencadenar las lluvias generalizadas que necesita la región. Esta vez el frente frío no logrará contener las temperaturas. El viento norte regresará apresuradamente y los termómetros retornarán a las marcas de los 30°C.

Pocos acumulados significativos y de manera puntual. Las lluvias y tormentas que se esperan para este viernes y sábado serán desparejas. Algunas ráfagas de viento intensas pueden acompañar al evento en zonas acotadas.

Posterior al pasaje del frente, las condiciones de tiempo serán estables. La presencia del viento del sector norte será constante. Con cielos despejados, la intensa radiación solar favorecerá el incremento de las temperaturas. Los valores más altos de temperaturas se esperan sobre Córdoba y el centro sur de Santa Fe. Las mínimas se presentarán con un promedio superior a los 20°C y las máximas podrían alcanzar un promedio de 32 a 35°C.

La humedad será importante solo durante parte del fin de semana, luego será muy escasa en toda la región.

Lo que pasó con el clima en la última semana en la región núcleo:

Pocas áreas recibieron lluvias

Las tormentas fueron desparejas y solo privilegiaron a unos pocos. Solo en Hernando, Córdoba, y en Rojas, Buenos Aires, los registros fueron de 48 y 46 mm, respectivamente. Al alejarse unos pocos kilómetros de los

dos epicentros de lluvias, los registros fueron prácticamente nulos en el resto de la región.

Los altos registros térmicos dieron la nota con valores por encima de lo que suele esperarse para esta época. Las temperaturas máximas promediaron entre 31 y 33°C, con un valor máximo de 36,3°C en Hernando, Córdoba.

Con este panorama, se sigue deteriorando las reservas hídricas en toda la región GEA. El único lugar que presenta una leve mejoría respecto de la semana pasada, es Córdoba, gracias a las lluvias recibidas. Pasó de condiciones de sequía a reservas escasas. El resto de la región presenta condiciones de humedad mucho más pobres que la semana pasada. En general las reservas hídricas de toda la zona GEA se presentan escasas y en las zonas de mayor humedad ya entran en la categoría de regulares.

Extensión GEA: O de Córdoba, N de Santa Fe, Santiago del E. y Chaco

La Niña se ha instalado y aumenta la dependencia a las circulaciones que ingresen humedad

José Luis Aiello, Dr. en Cs. Atmosféricas


El mapa de reservas de agua muestra la complicada situación por la que atraviesan los cultivos. Los indicadores del Pacífico Ecuatorial Central son coherentes con el comienzo de LA NIÑA. La misma seguirá instalada y estaremos dependiendo de circulaciones que puedan generar oferta de agua. Los próximos días esperamos montos bajos de lluvia y el panorama se hará difícil tanto para las siembras como el desarrollo de los cultivos implantados.

GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas





Semana al 07 de diciembre de 2017 - N° 531 - AÑO X - INFORME SEMANAL ZONA NUCLEO



GEA agradece el apoyo de las siguientes empresas

